



Cicatridina®

ЦИКАТРИДИНА

Вагінальні супозиторії з гіалуроновою кислотою та екстрактами 4-х лікарських трав

Медицинний виріб СЕ 0373
Свідчення про державну реєстрацію №12890/2013

ПРИРОДНИХ
КОМПОНЕНТІВ
ДЛЯ ЗАГОЄННЯ,
ЗВОЛОЖЕННЯ
ТКАНИН ПІХВИ
І ШИЙКИ МАТКИ



www.cicatridina.com.ua



ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ГАРАНТОВАНА
TUV SUD - сертифікат № Q1N 14 02 75765 002 (Германія)
відповідності вимогам на продукцію Європейській Директиві
EN ISO 13485:2012+AC:2012

ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ І ПРИРОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПІХВИ ТА ШИЙКИ МАТКИ



СПРИЄ ПРИРОДНОМУ
ЗАГОЄННЮ РАН



РЕГУЄ
ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС



СТВОРИЄ ЗАХИСТУ ПЛІВКУ
НА СЛИЗОВІЙ ПІХВИ
ТА ШИЙКИ МАТКИ



НОРМАЛІЗУЄ ПРИРОДНЕ
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА
ЗМАЗУВАННЯ ПІХВИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЖІНОК ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА ШИЙЦІ МАТКИ

Медведев Михайло Володимирович
акушер-гінеколог вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Після хірургічного лікування захворювань шийки матки у Вас з'являться вагінальні виділення, іноді з дещо неприємним запахом, домішками крові, які можуть тривати від 2 до 4 тижнів. Також 2-3 дні Вас може турбувати тягнучий біль внизу живота.

РЕКОМЕНДОВАНО:



З першого ж дня після процедури необхідно використовувати Цикатридина по 1 вагінальному супозиторію на ніч протягом 10-20 днів.



Для усунення болю можна приймати таблетки Ібупрофен 200 мг по 1-2 таблетки не більше 3 разів на добу.



Утримання від статевих стосунків протягом 1 місяця.



Обмежити фізичне навантаження протягом 1-2 тижнів.



Купання тільки під душем протягом місяця.



Спринцювання заборонено.



Не використовувати тампони.
Користуйтеся прокладками.



ПРИ ПІДВИЩЕННІ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА БІЛЬШЕ 38°C,
ПРИ ПОСИЛЕННІ БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТІВ АБО ВИНИКНЕННІ
РЯСУОЇ АБО ТРИВАЛОЇ КРОВОТЕЧІ
СЛІД НЕГАЙНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЛІКАРЯ.